

## 【内視鏡手術を受ける際に注意する薬剤と中止期間】

※抗血小板薬・抗凝固薬 単純投与の場合、観察と生検は休薬なしで施行できます。手術については下記の休薬期間が必要です。

※2剤以上服用の時は生検出来ない場合があります。

	薬剤名	中止期間
1	パナルジン、ブラビックス(チエノピリジン誘導体)	7日前
2	アスピリン含有製剤 <バイアスピリン/バファリン錠(330mg/81mg) ミニマックス顆粒、E・A・C錠、アスピリン末、 タケルダ>	5日前
3	ワーファリン	4日前
4	シロスタゾール	3日前
5	ブラザキサ、イグザレト、エリキュース	2日前
6	エパデール、エパデールS	1日前
7	プレタール	1日前
8	ロコルナール	1日前
9	ケタス	1日前
10	サアミオン	1日前
11	ベガ、ドメナン	1日前
12	ドルナー、プロサイリン、ケアロードLA、ベラサスLA	1日前
13	プロレナール、オパールモン	1日前
14	セロクラール、アポノール	1日前
15	コメリアン	1日前
16	ペルサンチン、ペルサンチンL、アンギナール	1日前
17	アンブラーグ	1日前
18	注射用カタクロット、キサンボン、キサンボンS	1日前



消化器内視鏡内科 つじもとクリニック

〒631-0036 奈良市学園北2丁目1-5

ローレルコート学園前レジデンス施設棟 1F

TEL0742(51)7000 FAX0742(51)6700